

Як приймати препарат INH:

1. Приймайте INH щоденно і в той самий час. Приймаючи пігулку препарату, викреслюйте відповідну дату в календарі. Дуже важливо, щоб при цьому ви не пропустили жодного дня.
2. Під час курсу лікування цим препаратом утримуйтеся від уживання алкогольних напоїв.
3. Тримайте пігулки INH у безпечному місці, недоступному для дітей.
4. Не пропускайте жодного візиту до лікаря.
5. Якщо у вас виникнуть побічні ефекти, зателефонуйте у відділ охорони здоров'я вашого округу і поговоріть з медсестрою, що слідує за ходом вашого лікування, або зі своїм лікарем.

6. Спеціальні вказівки:

Ваш наступний прийом у лікаря:

| | |
|-------|---------|
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |
| Дата: | Година: |

Якщо у вас виникнуть питання, зателефонуйте:



Florida Department of Health
TB Program

DH 150-824, 10/04

INH

*захищає вас
від туберкульозу*

Ukrainian Version

Я не хворий!

Навіщо мені приймати ліки?

Згідно результатів ваших аналізів, у вашому організмі є мікроби туберкульозу (ТБ), або ж ви останнім часом спілкувалися з хворим на активну, інфекційну форму туберкульозу. У вас поки що не розвинулась активна форма туберкульозної хвороби. На даний час мікроби ТБ у вашому організмі перебувають у стані «сплячки», проте вони живі. Вони потрапили до багатьох частин вашого тіла, наприклад, у легені, спинний хребет або нирки. У вас те, що називається «латентною», або прихованою ТБ-інфекцією. **При латентній туберкульозній інфекції, ви не можете передати ТБ іншим.**

Проте якщо ви захворієте іншою хворобою або ж у випадку виснаження вашого організму, мікроби ТБ можуть вийти зі стану сплячки і почати розмножуватись, що призводить до активної форми туберкульозної хвороби. **Якщо у вас розвинеться активна форма ТБ хвороби, ви можете передати її іншим, особливо людям, що знаходяться у вашому оточенні.**

Як позбавитись мікробів туберкульозу в моєму організмі?

Ви можете приймати ізоніазід, відомий також під назвою ІНН. Цей протитуберкульозний препарат може вбити мікроби ТБ. Якщо приймати цей препарат згідно вказівок лікаря, він набагато зменшить ризик розвитку у вас активної форми туберкульозної хвороби.

Як довго мені слід приймати ІНН?

ІНН звичайно приймають один раз на день або у відповідності зі вказівками вашого лікаря. Термін лікування — від шести до дев'яти місяців.

ІНН допомагає лише тоді, коли він приймається регулярно — щоденно чи згідно вказівок вашого лікаря.

Вас можуть перевести на режим постійного нагляду (РПН) протягом усього періоду лікування. РПН означає, що кожного разу, коли вам час приймати ІНН, ви зустрічатиметесь з медичним працівником, який спостерігатиме, як ви приймаєте ліки.

Чи ІНН є безпечним для вживання?

Результати дослідів показали, що ІНН є безпечним і ефективним препаратом для пацієнтів будь-якого віку. У більшості пацієнтів, що вживають цей препарат, не спостерігається ніяких ускладнень. Але, як і при вживанні будь-яких інших медичних препаратів, не виключається виникнення побічних ефектів. Вони, як правило, не тривають довго і зникають з припиненням лікування.

Якщо у вас виникло одне із ускладнень, перелічених нижче, ПРИПИНІТЬ прийом ІНН і негайно зателефонуйте своєму лікареві чи медичній сестрі вашого окружного відділу охорони здоров'я.

Побічні ефекти ІНН:

1. Втрата апетиту і безпричинне відчуття стомленості.
2. Сеча темного кольору (кольору чаю або кави).
3. Жовтий або «туманний» колір очей.
4. Жовтий колір шкіри, висип або постійна сверблячка шкіри.
5. Постійне поколювання («ніби голочками чи шпильками») або занеміння рук чи ніг.
6. Непояснимо висока температура.

Допоможіть самі собі захиститись від ТБ!

