

## Савети за узимање ИНХ-а:

1. Узимајте ИНХ у исто време сваки дан.  
Користите календар да прекрижите сваки дан када узмете таблету. Јако је важно да приликом узимања овог лека не прескочите ни један дан.
2. Не конзумирајте алкохол док узимате овај лек.
3. ИНХ чувајте на сигурном месту ван дохвата деце.
4. Не заборавите да идете на све своје заказане прегледе.
5. Ако приметите нежељена дејства назовите своју медицинску сестру или лекара који вам прати лечење.

### 6. Специјалне упуте:

---

---

---

---

---

---


---

---

## Ваш следећи преглед је:

Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:
Датум:	Време:

Ако имате питања, назовите:



# ИНХ

*између вас  
и туберкулозе*

Florida Department of Health  
**TB Program**

DH 150-826, 10/04

Serbo-Croatian Version

# Нисам болестан!

## Зашто да узимам лекове?

Ваш тест је показао да у телу носите бациле туберкулозе (ТБЦ) или да сте недавно били изложени активној инфективној туберкулози. Још увек немате активно развијено оболење. У овом тренутку бацили туберкулозе у вашем телу су „успавани”, али живи. Путовали су кроз многе делове вашег тела као што су плућа, кичма или бубрези. Имате оно што се назива „латентна туберкулоза”. **Када имате латентну туберкулозу, оболење не можете да пренесете на друге.**

Међутим, ако оболите од неке друге болести или постанете изнурени, ТБЦ бацили могу да се пробуде и почну размножавати и да затим пређу у активну туберкулозу. **Ако добијете активну туберкулозу, можете да је пренесете на друге људе, нарочито на особе које су вам најближе.**

## Како да се решим ТБЦ бацила у телу?

Можете да узмете изониазид, познат под називом ИНХ, лек који уништава ТБЦ бациле. Узимање овог лека према упутама лекара ће увелико да вам смањи могућности развијања активне туберкулозе.

## Колико дуго морам да узимам ИНХ?

ИНХ се обично узима једном дневно или према упутама лекара. Дужина лечења варира од шест до девет месеци.

**ИНХ делује само ако се узима редовно — сваки дан или према упутама лекара.**

Током свог лечења можете да будете на лечењу с директним посматрањем (ДОТ). ДОТ значи да здравствени радник мора бити присутан сваки пут када треба да узмете лек и да се увери да сте га узели.

## Да ли је ИНХ безбедан?

Студије су показале да је ИНХ веома безбедан и ефикасан лек за људе свих старосних група. Већина људи нема никаквих проблема приликом узимања овог лека. Као и са другим лековима, може да дође до нежељених дејстава која обично нису дуготрајна и престају чим се лечење прекине.

**Ако приметите неки од доле наведених проблема, ПРЕКИНИТЕ са узимањем ИНХ-а и одмах назовите свог лекара или медицинску сестру из локалног дома здравља.**

## Нежељена дејства ИНХ-а:

1. Губитак апетита и безразложан осећај умора.
2. Урин тамне боје (боје чаја или кафе).
3. Жуте или „мутне” очи.
4. Пожутела кожа, осип или константан сврабеж.
5. Константни жмарци („као боцкање иглица”) или утрнуlost руку или ногу.
6. Необјашњива висока температура.

Заштитите се  
од туберкулозе!

