

Savjeti o uzimanju INHa:

1. Uzimajte INH svaki dan u isto vrijeme. Označite na kalendaru svaki put kad uzmete tabletu. Vrlo je važno da ni jednog dana ne propustite uzeti svoj lijek.
2. Nemojte piti alkoholna pića dok uzimate ovaj lijek.
3. Držite svoj INH na sigurnom mjestu van dječjeg dosega.
4. Nemojte zaboraviti doći na svaki sastanak.
5. Ako dobijete popratne pojave, zovite bolničarku Općinskog zdravstvenog centra koja se brine o vašem liječenju ili svog doktora.

6. Specijalne upute:


Vaš slijedeći sastanak:

Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:
Datum:	Vrijeme dana:

Ako imate pitanja, zovite:

Florida Department of Health
TB Program

DH 150-825, 10/04



INH

*je između
vas i tuberkuloze*

Bosnian Version

Ja nisam bolestan!

Zašto trebam uzimati lijekove?

Vaši testovi pokazuju da u tijelu imate klice tuberkuloze (TB) ili da ste nedavno bili izloženi nekome tko ima aktivnu, zaraznu TB bolest. Vi još nemate aktivnu TB bolest. Trenutačno su vaše klice TBa u stanju „spavanja” ali su žive. Putovale su u mnoge dijelove vašeg tijela, kao pluća, kičmu ili bubrege. Vi imate takozvanu „latentnu TB infekciju”. **Kad imate latentnu TB infekciju, ne možete TB prenijeti na druge ljude.**

Međutim, ako obolite od neke druge bolesti ili postanete „iscrpljeni”, klice TBa se mogu probuditi, početi proizvoditi više klica TBa i razviti se u aktivnu TB bolest. **Ako se vaše stanje razvije u aktivnu TB bolest, moći ćete TB prenijeti na druge ljude a naročito one koji su vam najbliži.**

Kako da se riješim klica TBa u mom tijelu?

Možete uzimati isoniazid, još poznat kao INH, koji je lijek koji ubija klice TBa. Ako taj lijek uzimate prema uputama doktora, uvelike će vam smanjiti mogućnost dobivanja aktivne TB bolesti.

Kako dugo ću morati uzimati INH?

INH se obično uzima jednom dnevno ili prema uputama vašeg doktora. Dužina tretmana varira od šest do devet mjeseci.

INH radi samo ako ga uzimate redovito – svaki dan ili prema uputama vašeg doktora.

Za vrijeme trajanja vašeg liječenja mogu vas staviti u terapiju direktnog promatranja (DOT). DOT znači da će se zdravstveni radnik s vama sastati svaki put kad uzimate INH i promatrati vas dok ga uzimate.

Je li INH bezopasan?

Studije su dokazale da je INH potpuno bezopasan i efikasan lijek za ljude svih dobi. Većina ljudi nema problema s uzimanjem tog lijeka. Kao i u drugih lijekova, može doći do popratnih pojava. One obično ne traju dugo i nestanu s prestankom tretmana. **Ako iskusite bilo koji niže navedeni problem, PRESTANITE uzimati INH i smjesta nazovite svog doktora ili bolničarku Općinskog zdravstvenog centra.**

Popratne pojave kod uzimanja INHa:

1. Bezrazložan gubitak apetita i umor.
2. Tamnobojna mokraća (boje čaja ili kafe).
3. Oči žute ili „prljave” boje.
4. Žuta koža, osip ili stalno svrbljenje kože.
5. Stalno bockanje (kao „mravci”) ili utrnulost ruku ili nogu.
6. Neobjašnjiva visoka vrućica.

Pomozite da se zaštitite od TBa!

